乳房(多因梅毒性小兒哺乳而生。乳嘴乳量等處。每成數裂之狀。或為極淺之 病治療

證保有用信實切求務版出

手指(醫生產婆看護婦等。

往住見之。其周圍佩異常浸潤

繼幹及四肢 硬結形圓或腰圓。中央之皮膚刺脫。)

己。梅毒疹

六二〇

顧 法 師 間 律 爲

吐血與肺癆

楊志一著

有無知之病者。竟稱不問料為高明。皆問詢者為無術。獨不 其虛實。問者聽其聲音。辨其邪正。問者詢其情狀。知其寒 脈病原有不合。倉卒一診。安能盡中病情。攸薛氏云。脈者 **皿之徵兆也。病態萬殊。** 而屬診世人。世人亦知醫家以此而臨診。以望者看其形色。 學術經驗。而臨診之方法。又操之於與開問切也。醫家乃以此 世間病情。離奇變幻。千頭萬緒。路能診斷者。其把握固由於 切者診其脈息。 只診其脈。完不問病。即 **畸診必先問致病之因與**

楊志 **6**上醫

(乙)門診一元 (丁)膏丸方四元 (丙)出診四元

代國內年五每 現外本二個三定 九加外元月日 報 五倍均數元一出 計郵一數元一出 值 文章

格人及驗經識學有者持主

之本幸門開代九有。的之發售此。症。至之。醫煞丹 傲館福。病為樂效而確讀起各。本。且沉外殊治名方 旨發之謀家推。者曾靈者。地是館愈。同。出病醫一 也起途進方銷本。經驗。凡靈以有於繼。每人之。味 。斯。人便。館製試之如各樂有鑒霍綿見有意奇我。 舉此羣之大願爲驗方有填之代于然之效數料効中氣

問世俾世之思吐血症者共登健康之途也要知太常則有疑血成療之弊太温則有遏血妄要知太常則有疑血成療之弊太温則有逼血妄要知太常則有疑血成療之弊太温則有逼血妄以血性傳世之思吐血藥或偏於凉或偏於温以致不但無吐血一症為讓成肺療乙根源延久不治每致危

丹靈血吐

呈桃花色之斑紋

報識常學醫會社名义

之主要症狀也。梅毒疹(即俗呼爲楊梅瘡者是。數年之間。出沒隱現。爲病者困苦

梅毒既蔓延全身。遂發於肌表而爲疹。故梅毒疹爲全身梅毒之確徵。亦

其形不一。有班性梅毒疹。邱疹性梅毒疹。平扁濕疣。膿疱梅毒疹。皮膚橡皮腫之別

初尚稍淡。經久愈濃。其在下肢者

疹之排加

發生最多之都位。真如前額。頭項。髮際眼鼻耳

四寫科驗方十則

稿投迎勵

病

治

六(林整)

途健婦指痛疾婦解 徑康女導苦病女决

:證

*

(四十六)

烫傷神效方、 系爭長砂

 \mathbf{v}_{i}

級馬勃末、